

**„Die Ausscheidung gonadotropen Wirkstoffes
nach Zufuhr von Prolan.“**

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

der

Hohen Medizinischen Fakultät

der

Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität

zu Bonn.

Vorgelegt am 14. Dezember 1937

von

Aenne Millard

aus Köln.

Gedruckt mit Genehmigung der Medizinischen Fakultät
der Universität Bonn.

Referent: Prof. Dr. Rupp.

Korreferent: Prof. Dr. Siebke.



Meinen Eltern

gewidmet!



Digitized by the Internet Archive
in 2026

In der Therapie mit Follikelhormon hat früher die Frage eine große Rolle gespielt, wieviel Einheiten dieses Hormons nach Zufuhr per os den Körper wieder verlassen. (Siebke, Gyn. Kongreß 1933 Berlin.). Man äußerte gelegentlich die Ansicht, daß die Hormonmengen, die im Harn wiedergefunden wurden, sozusagen am Erfolgsorgan vorbeigelaufen seien und erklärte daher Dosen, die eine stärkere Erhöhung der Follikelhormonausscheidung im Harn bewirkten, für übermäßig hoch. In der Folgezeit verloren diese Stimmen aber immer mehr an Gewicht, und es gibt heute kaum einen Gynäkologen, der bei der Therapie mit Follikelhormon die Ausscheidung dieses Hormons im Harn bestimmt. Die Praxis hat auch gezeigt, daß dies unnötig ist, und daß man sich in der Indikationsstellung sehr wohl nur nach dem gesamten klinischen Bild richten kann, ohne auf die zeitraubenden Hormonspiegel-Untersuchungen zurückgreifen zu müssen.

Während die Therapie mit Follikelhormon von Jahr zu Jahr bessere Grundlagen gewinnt und auch immer erfolgreicher angewandt wird, tritt die Behandlung mit gonadotropem Hormon mehr und mehr in den Hintergrund. Wir haben einsehen müssen, daß die Ovarialinsuffizienz mit Amenorrhoe keineswegs so prompt auf die Verabreichung von Prolan-Präparaten aus Schwangerenharn (welche das gonadotrope Prinzip enthalten) ansprach, wie man es sich ursprünglich in Analogie zum Tierversuch (Aschheim-Zondek-Reaktion) vorgestellt hatte.

Die Therapie mit Follikelhormon hat ihren großen Aufschwung genommen durch die Lösung der Dosierungsfrage, dies ist bisher in der Geschichte der Behandlung mit gonadotropem Hormon nicht eingetreten: Jetzt wie vor Jahren sind diese Hormone in Ampullen zu 100 und 500 Ratten-Einheiten (RE) im Handel, während die Konzentration der Follikelhormonpräparate von wenigen Mäuse-Einheiten (ME) auf 50 000, ja 100 000 ME gestiegen ist. Gonadotropes Hormon liegt in stärkeren Konzentrationen bisher nicht vor,

und darin liegt das Hindernis für den Aufschwung der Therapie mit diesem Hormon.

Daß mit diesem Hormon, wenn es nur in genügend großer Menge zugeführt wird, am Ovar der Frau sichere anatomische Veränderungen erzielt werden können, haben Hamblen und Roß: Arch. Gyn. 163,3 (1937) Trettenero: Riv. Ital. Gynec. 19. 380 (1936) u. a. gezeigt. Damit wurde wahrscheinlich gemacht, daß auch das Problem der Wirksamkeit gonadotropen Hormons ein quantitatives ist.

Wenn demnach folgerichtig in Zukunft eine Erhöhung der Dosen gonadotropen Hormons gefordert werden muß, so ist anzunehmen, daß sich Stimmen erheben werden, die von unphysiologisch großer Zufuhr dieses Hormons sprechen, genau wie es vor Jahren beim Follikelhormon der Fall war.

Man könnte diesen Warnern vorhalten, daß während der Schwangerschaft bekanntlich große Mengen gonadotropen Wirkstoffs im Harn ausgeschieden werden, nämlich pro Tag mehrere Tausend ME, bei pathologischer Schwangerschaft sogar 100 000 ME und darüber, und daß deshalb die Steigerung der Zufuhr keineswegs schädlich zu sein brauche. Immerhin ist aber zuzugeben, daß die Schwangerschaft ein besonderer hormonaler Zustand ist, der nicht ohne weiteres mit einem krankhaften Funktionszustand der Ovarien verglichen werden kann, wie er immer vorliegen wird, wenn eine Hormontherapie überhaupt berechtigt sein soll. Darum erschien es notwendig, die Größe der Ausscheidung gonadotropen Hormons im Verhältnis zur zugeführten Menge bei der gefunden Frau und während eines pathologischen Funktionszustandes im Ovar zu verfolgen.

Wenn wir diese Ausscheidungswerte kennen lernen wollen, so muß man zuerst wissen, wie hoch die Hormonwerte ohne künstliche Zufuhr sind. Diese liegen nach Zondek zwischen 5 und 25 RE pro Tag, wobei die größten Mengen etwa zur Zeit der Ovulation, die niedrigsten um die Menstruation herum gefunden wurden. Von Katzman und Doisy werden etwa 5 RE pro Tag angegeben. Hier handelt es sich um Ratteneinheiten; bei Umrechnung auf Mäuseeinheiten, von denen in dieser Arbeit allein die Rede ist, wür-

den sich nach H a m b u r g e r (Studien ufw. S. 82) zwei- bis dreifach höhere Werte ergeben.

Außerhalb der Schwangerschaft ist nur dasjenige gonadotrope Hormon nachweisbar, das im Hypophysenvorderlappen gebildet wird. Dieser Wirkstoff ist nach den Untersuchungen von E w a n s und vielen anderen nicht mehr identisch mit dem Stoff, den höchstwahrscheinlich die Plazenta in der Schwangerschaft bildet. In den hier mitgeteilten Versuchen ist dieser allein zur Anwendung gekommen (in Form des „Prolan“-„Bayer“). 1)

Ferner waren mehrere methodische Einzelheiten zu bedenken:

1. Wenn die Prolanausscheidung im Harn groß ist, so können die Werte an dem frisch gelassenen Harn bestimmt werden; ist sie aber klein, so müssen Konzentrationsmethoden Anwendung finden, damit das Hormon überhaupt im Harn nachgewiesen werden kann. Solcher Methoden gibt es eine ganze Anzahl: Alkoholfällungsmethode von Z o n d e k, Benzoefäureverfahren von K a t z m a n und D o i s y, Wolframsäuremethode von K a t z m a n und D o i s y, Pyridinverfahren, alkalisches Acetonverfahren von D a v y und S e v r i n g h a n s u. a. m. Wir haben allein die Z o n d e k'sche Alkoholfällungsmethode mit geringfügiger Abänderung angewendet, die auch Chr. H a m b u r g e r bei feinen sorgfältigen Untersuchungen gute Dienste geleistet hat. Von verschiedenen Seiten wird der Methode der Vorwurf gemacht, daß sie nicht alles Hormon erfasse (M a f f a o I t o, K a t z m a n und D o i s y, D a v y und S e v r i n g h a n s). Doch teilt H a m b u r g e r mit, daß er bei Vergleichuntersuchungen Hormonmengen in der Alkoholfällung wiedergefunden hat, die meistens näher an 100% als an 50% der tatsächlich vorhandenen Hormonmengen lagen.

Beschreibung der Methode:

Der Harn wird, falls er alkalisch ist, mit Essigsäure angeäuert, so daß blaues Lakmuspapier sich rötet; dann versetzt man ihn mit der 5fachen Menge 96%igen Alkohols und schüttelt gut durch,

1) Für die Überlassung großer, hochkonzentrierter Versuchsmengen sei der Firma „Bayer“ auch an dieser Stelle ergebenst gedankt.

etwa 10 Minuten. Die Mischung bleibt 12—24 Stunden im Kalten stehen, bis sich ein Niederschlag von einer klaren Flüssigkeit abgesetzt hat. Diese wird mit der Wasserstrahlpumpe vorsichtig abgelaugt, und nun der Rest durch Hartfilter filtriert. Der Rückstand trocknet in kurzer Zeit an der Luft; man kratzt ihn sorgfältig vom Filter ab, da er das Hormon enthält, und nimmt ihn in destilliertes Wasser auf. Das Hormon geht in Lösung; durch Zentrifugieren werden die unlöslichen Ballaststoffe entfernt. Die wässrige Hormonlösung wird mit 4facher Menge Äther versetzt und gut geschüttelt. Den Äther läßt man zum größten Teil abfließen, zum kleinen verdunsten und füllt nun die Hormonlösung mit destilliertem Wasser auf die gewünschte Flüssigkeitsmenge auf.

2. Wenn in einem Harn schon vor der Prolanzufuhr Hypophysenvorderlappenhormon nachweisbar war, so kamen nach Prolanzufuhr die ausgeschiedenen Mengen dieses Hormons hinzu. Nun ist aus den Untersuchungen von E w a n s und Mitarbeitern bekannt, daß die Kombination von Hypophysenvorderlappenhormon und placentarem Hormon nicht nur additive, sondern potenzierte Wirkung am Nagerovar entfaltet, so daß Prolanmengen vorgetäuscht werden können, die gar nicht im Harn vorhanden sind. Dieser Fehler ist nicht auszuschalten und muß beim Vergleich der einzelnen Ausscheidungskurven berücksichtigt werden.

Auswahl der Versuche:

Als Versuchstiere benutzten wir infantile weibliche Mäuse von 6—8 gr Gewicht. Wir nahmen für jeden Titrationsversuch 3—4 Tiere. Als 1 ME luteinisierenden Wirkstoffs (B) wurde diejenige kleinste Hormonmenge bezeichnet, die bei wenigstens einem von den 3—4 Tieren die Bildung eines Blutpunktes oder eines Gelbkörpers hervorrief, als 1 ME-Follikelreifungshormon (A) diejenige Menge, die bei einem von drei oder bei zwei von vier Tieren eine Follikelreifung bewirkte, welche den Scheidenabstrich leukozytenfrei machte (was mindestens dem Prooestrus entspricht). Insgesamt wurden 555 Mäuse für die vorliegenden Untersuchungen verwendet.

1. Die perorale Darreichung von „Prolan“ hat früher eine größere Rolle gespielt als jetzt, da man inzwischen ge-

lernt hat, daß sie so gut wie wirkungslos ist. Das Hormon, offenbar ein Stoff mit Eiweißcharakter, wird von Säuren und Basen so rasch angegriffen, daß aus dem Magendarmkanal kaum etwas zur Resorption gelangen dürfte. So konnte Zondek durch Verfütterung von 1400 ME A und B (Hormone des Ovariums und des Hypophysenvorderlappens, 2. Aufl. S. 516) bei infantilen Mäusen nur Follikelreifung, keine Gelbkörperbildung auslösen, was ihm aber bei infantilen Ratten mit 5—700 RE sicher gelang. Ganz aussichtslos erschien daher die Erprobung am Menschen nicht, um so weniger, als die Firma „Bayer“ freundlicherweise Prolantabletten zur Verfügung stellte, deren Oberfläche so präpariert war, daß sich die Dragées nicht schon im sauren Mageninhalt, sondern erst im alkalischen des Dünndarms auflösen sollten; gegen Alkali ist Prolan etwas widerstandsfähiger als gegen Säure (Westman, Zschr. Geb. u. Gyn. 110, 11 (1935)). Jede Tablette enthielt 4000 RE, was nach unseren Testierungsversuchen etwa 800 MEA und 400 MEB entsprach.

Es wurden 8 Fälle untersucht:

1. Frl. E. B., 33 Jahre, kein Partus, kein Abort.
 Regel: alle 4 Wochen, 5—6 Tage, sehr stark.
 Letzte Regel: 6.—12. 6. 36.
 Klin. Diagnose: Dysmennorrhoe.
 12. 6. 36. 10.30, 13, 18.30 Uhr je 3 Prolandragées.
 = insgef. 7200 ME.
 Der Sammelharn vom 12.—14. 6. 36 erwies sich im gewöhnlichen Aschheim-Zondek-Versuch (A—Z-Versuch) als frei von gonadotropem Hormon. Größte injizierte Menge: $6 \times 0,3$ ccm.
2. Fr. W. B., 45 Jahre, vier Partus, kein Abort.
 Früher: Regel: alle 4 Wochen, 6—8 Tage, sehr stark.
 Jetzt: Dauerblutung seit Anfang Mai 1936.
 Klin. Diagnose: Status nach Dauerblutung (Glanduläre Hyperplasie?).
 12. 6. 36. 14.30 5 Prolandragées.
 13. 6. 36. 14.30 und 18.30 je 5 Prolandragées,
 = insgesamt 12000 ME.
 Der A—Z-Versuch mit dem vom 12. 6.—14. 6. 36 gelassenen Sammelharn war negativ. Größte injizierte Menge: $6 \times 0,3$ ccm.
3. Frl. R. B., 18 Jahre, kein Partus, kein Abort.
 Regel: alle 4 Wochen, 1 Tag, sehr schmerzhaft.

Letzte Regel: 24.—25. 6. 36.

Klin. Diagnose: Hypoplastisches Genitale.

4. 7. 36. 13 und 17 Uhr je 5 Prolandragées,

5. 7. 36. 8 Uhr 5 Prolandragées,

= insgesamt 12 000 ME.

A—Z-Verfuch mit dem vom 4.—6. 7. 36 gelassenen Harn war negativ. Größte injizierte Menge: $6 \times 0,4$ ccm.

4. Fr. E. F., 42 Jahre, 4 Partus, 2 Aborte.

Früher: Regel: alle 4 Wochen, 3—4 Tage, schwach.

Jetzt: Dauerblutung seit 22. 6. 36.

Klin. Diagnose: Glanduläre Hyperplasie.

8. 7. 36. 9 und 19 Uhr je 5 Prolandragées.

9. 7. 36. 9 Uhr 5 Prolandragées.

10. 7. 36. 13 Uhr 20 Prolandragées.

11. 7. 36. 14 Uhr 30 Prolandragées.

= insgesamt 52 000 ME.

Im gesamten vom 8.—14. 7. 36 gelassenen Harn ließ sich mit dem A—Z-Verfuch kein gonadotropes Hormon nachweisen. Größte injizierte Menge: $6 \times 0,4$ ccm.

Die folgenden drei Patientinnen erhielten etwas Tinct. opii simpl., damit der Aufenthalt der Dragées im Darmkanal verlängert wurde.

5. Fr. M. A., 25 Jahre, 1 Partus, kein Abort.

Regel: alle 4 Wochen, 3—4 Tage, mittelftark.

Letzte Regel: 23.—27. 7. 36.

Klin. Diagnose: Adnexerkrankung.

13. 8. 36. 17,30 Uhr 30 Prolandragées und 10 Tropfen Tinct. opii simpl.

14. 8. 36. 17,30 Uhr 30 Prolandragées und 10 Tropfen Tinct. opii simpl.

= insgesamt 48 000 ME.

A—Z-Verfuch mit dem Sammelharn vom 13.—15. 8. 36 war negativ. Größte injizierte Menge: $6 \times 0,3$ ccm.

6. Fr. E. F., 50 Jahre, 5 Partus, kein Abort.

Regel: alle 4 Wochen, 3 Tage, mittelftark.

Letzte Regel: 18.—24. 7. 36, sehr ftark.

Klin. Diagnose: verstärkte Regelblutung, Erosion der Portio.

16. 8. 36. 13 Uhr 30 Prolandragées und 10 Tropfen Tinct. opii simpl.

17. 8. 36. 13 Uhr 30 Prolandragées und 10 Tropfen Tinct. opii simpl.

= insgesamt 48 000 ME.

In dem Sammelharn vom 16.—18. 8. 36 konnte auch bei zehnfacher Konzentrierung kein gonadotroper Wirkstoff nachgewiesen werden.

7. Frl. K. T., 18 Jahre, kein Partus, kein Abort.
Regel: alle 4 Wochen, 3—4 Tage, mittelfark.
Letzte Regel: 25.—31. 7. 36.
Klinische Diagnose: Hypoplastisches Genitale.
23. 8. 36. 12 Uhr 40 Prolandragées und 10 Tropfen Tinct. opii simpl.
= insgesamt 32 000 ME.
Die Versuche mit dem Sammelharn vom 23.—24. 8. 36 waren negativ bei einer Injektionsmenge von $6 \times 0,3$ ccm.
8. Fr. W. Sch., 22 Jahre, 2 Partus, kein Abort.
Regel: alle 4 Wochen, 5—6 Tage, sehr stark.
Letzte Regel: 17.—20. 8. 36.
Klin. Diagnose: entzündliche Adnexerkrankung.
24. 8. 36. 7 Uhr 40 Prolandragées.
= insgesamt 32 000 ME.
Der Sammelharn vom 24.—25. 8. 36 wurde 10fach konzentriert. 12 Stunden nach der Einnahme der Prolantabletten wurden der Patientin 5 ccm Serum entnommen. Sowohl die Versuche mit dem Harn, als auch die Serumversuche waren negativ. Größte injizierte Harnmenge: $6 \times 0,3$ ccm, größte injizierte Serummenge: $6 \times 0,2$ ccm.

Wenn sich damit selbst nach Einnahme von 65 Dragées = 52000 ME oder 260 000 RE Prolan kein Hormon im Harn nachweisen ließ, so muß hier eine Einschränkung gemacht werden: wir wissen nicht, ob die Hülle der Tabletten überhaupt zerstört wurde, d. h. ob dem Körper die Möglichkeit gegeben war, das Prolan aus dem Darm zu resorbieren. Da die Faeces aus äußeren Gründen weder auf ungelöste Tabletten noch auf gonadotropes Hormon untersucht werden konnten (wodurch man die Frage hätte lösen können), beweisen die Versuche eigentlich nur, daß die Verabreichung der betreffenden Prolantabletten keine wesentliche Vermehrung der Hormonausscheidung zur Folge hatte — eine Feststellung, die wenigstens für die Hersteller von Interesse war.

Diesem negativen Ergebnis der Harnuntersuchung entsprach auch der therapeutische Mißerfolg in einem Falle von rezidivierender glandulärer Hyperplasie: Während einer Dauerblutung wurden innerhalb von 7 Tagen 30 Tabletten genommen. Die Blutung nahm

ein wenig an Stärke ab, doch förderte eine Abrasio, die am 16. Tag nach Beendigung der Prolankur erfolgte, reichlich hyperplastische Schleimhaut zutage — ein Zeichen dafür, daß der persistente Follikel unbeeinflusst geblieben war.

II. Nach parenteraler Verabreichung ist dagegen wiederholt die Wirksamkeit des Prolan nachgewiesen worden; hier waren positive Ausscheidungsergebnisse zu erwarten.

Mitteilungen über die Höhe der Ausscheidung von plazentarem gonadotropen Hormon liegen vor von Erhardt und Winkler sowie von Zondek für die Frau, von Parkes und White, Lipfchütz und Zondek für Tiere. Zondek fand bei der Frau bei subkutan zugeführtem Prolan 5—10% im Harn wieder. Erhardt und Winkler konnten bis zu 20 Stunden nach der intravenösen Injektion Prolan A und B im Harn nachweisen, nach 48 Stunden nur noch Prolan A, nach 60 Stunden war der Harn frei von Prolan. Bei der Ratte fand Zondek 5% des subkutan zugeführten Prolans in 48 Stunden im Harn wieder, Parkes und White ungefähr ein Drittel bei intravenöser Zufuhr beim Kaninchen. Lipfchütz wies nach 4 Stunden noch die Hälfte des intravenös injizierten Prolans im Blut nach beim Kaninchen, nach 8 Stunden etwa nur noch ein Viertel und nach 12 Stunden nur noch ein Achtel.

Für die eigenen Versuche standen uns Ampullen mit 2000 und 5000 RE Prolan zur Verfügung — Hormonmengen also, wie sie bisher nicht im Handel sind. Die Hormonlösung wurde stets intramuskulär verabreicht. Außer ganz vorübergehenden Schmerzen an der Injektionsstelle traten im Anschluß an die Einspritzung niemals Nebenerscheinungen auf.

Da wir als Versuchstiere Mäuse verwendeten, die Stärke der Prolanpräparate aber in Ratteneinheiten angegeben war, mußten wir sie an Mäusen testieren. Wir erhielten folgende Werte: 1 Ampulle mit 5000 RE Prolan enthielt nach unserer Testierung etwa 2500 ME Prolan A und 1000 ME Prolan B. 1 Ampulle mit 2000 RE Prolan 1000 ME Prolan A; Prolan B wurde bei den Ampullen mit 2000 RE nicht testiert. Das sind Annäherungswerte, wie überhaupt betont werden muß, daß die Mengenbestimmung der gonado-

tropen Hormone im Tierversuch niemals mit derselben Genauigkeit vorgenommen werden kann wie z. B. die des Follikelhormons; die Gründe dafür sind von D a m m dargelegt worden. Deshalb dürfen alle hier angegebenen Ziffern nur als grobe Annäherungswerte betrachtet werden.

Wir konnten in 7 Fällen die Prolanausscheidung feststellen; und zwar wurde immer eine Patientin mit normalem oder annähernd normalem Zyklus und eine andere mit Follikelpersistenz möglichst gleichzeitig und mit denselben Dosen behandelt, weil ursprünglich die Absicht bestand, die Untersuchungen von E r h a r d t und W i n k l e r zu erweitern. E r h a r d t und W i n k l e r hatten deutliche Unterschiede in der Hormonausscheidung nach Schwangerenblutübertragung zwischen normalen Frauen und solchen mit Follikelpersistenz gefunden.

Aus den Kurven, die alle im gleichen Maßstab gehalten sind, geht die Höhe der ausgeschiedenen Prolanmengen hervor. Verhältnismäßig häufig konnte die Hormonmenge nicht einmal annähernd genau bestimmt werden; der vermutliche Wert liegt dann innerhalb des über der Kolonne jeweils angegebenen Spielraumes. Selbstverständlich wurden die Hormonbestimmungen am Sammelharn vorgenommen; die angegebenen Zahlen betreffen also Tageswerte.

1a. Fr. Ch. R., 34 Jahre, 1 Partus, 2 Aborte.

Regel: unregelmäßig, 4, 5, 6wöchentlich, 1—2 Tage, sehr schwache Blutung.


Letzte Regel: 15.—17. 9. 36.

Erste Regel nach Hormonbehandlung: 20.—21. 11. 36.

Klin. Diagnose: Kreuzschmerzen unklarer Herkunft.

9. 10. 36 eine Prolaninjektion von 5000 RE.

Der Harn wurde vom 8.—12. 10. 36 untersucht. Die größte Injektionsmenge war $5 \times 0,2$ ccm 10 fach konzentriert. Die Kurve verläuft ganz atypisch, wie aus einem Vergleich mit den folgenden (2 u. 3) hervorgeht: Hohe Ausscheidung gleich am ersten Tag nach der Injektion, geringe am zweiten, Wiederanstiegen am dritten Tag. Als Mangel muß betrachtet werden, daß der Vorversuch nur am nativen und nicht am konzentrierten Harn angestellt wurde; es ist durchaus möglich, daß der Harn ganz unabhängig von der Prolanbehandlung zeitweise vermehrte Mengen A-Hormon enthielt, denn die Zykluspausen betrugen bei der Patientin bis zu



Frau C. R.
1a 34 J.

6 Wochen. Die Höhe der letzten Säule macht es wahrscheinlich, daß auch noch an den folgenden Tagen Hormon nachweisbar gewesen wäre. Die Ausscheidungswerte fallen so sehr aus dem Rahmen der übrigen heraus, daß man nahezu mit Sicherheit auf das Vorliegen eines (unbekannten) Faktors schließen kann, der die Ergebnisse stark beeinflusst. Eine junge Gravidität ist auszuschließen, da der weitere Verlauf beobachtet wurde.


1b. Fr. E. R., 32 Jahre, 1 Partus, 1 Abort.

Regel: alle 4 Wochen, 3—5 Tage, mittelfark; seit November 1935 unregelmäßig, Pausen bis zu 8 Wochen und Blutungen bis zu 3 Wochen.

Jetzt: seit 3 Wochen Dauerblutung.

Klin. Diagnose: Follikelpersistenz mit glandulärer Hyperplasie.

1. 10. 36 eine Prolaninjektion von 5000 RE.



Der Harn wurde vom 1.—3. 10. untersucht, die größte Injektionsmenge betrug $6 \times 0,2$ ccm, 10fach konzentriert. Ein Vorversuch wurde nicht angestellt, außerdem ist die Ausscheidung nur 2 Tage

lang geprüft worden, eine Zeitspanne, die nach den weiteren Erfahrungen als zu kurz bezeichnet werden muß. Im Gegensatz zu Fall 1a ist hier die Ausscheidung auffallend gering; es wurde eine Gesamthormonmenge von ca. 172 ME A ausgeschieden; B wurde (wie im Falle 1a) nicht nachgewiesen.

2a. Frl. C. M., 23 Jahre, kein Partus, kein Abort.

Regel: alle 4 Wochen, 7—8 Tage, sehr stark.

Letzte Regel: 7.—14. 10. 36.

Klin. Diagnose: Hypoplastisches Genitale.


24. 10. 36. 11 Uhr eine Prolaninjektion von 5000 RE.

20 Uhr, eine Prolaninjektion von 5000 RE.

Der Harn wurde vom 23.—28. 10. 36 untersucht.

Größte Injektionsmenge $6 \times 0,3$ ccm, 10fach konzentriert. Die Gesamthormonausscheidung: größer als 886 ME A und größer als 247 ME B.

Höchstauscheidung: am dritten Tag nach der Injektion.



2b. Fr. M. Sch., 33 Jahre, 3 Partus, 2 Aborte.

Früher: Regel: alle 3 Wochen, 3—4 Tage, mittelfark.


Jetzt: seit Ende September 36 Dauerblutung.

Klin. Diagnose: Abgelaufene glanduläre Hyperplasie.

Mikrosk. Diagnose: Basalis mit dicht stehenden epithelreichen, aber nicht hyperplastischen Drüsen, keine sicheren Sekretionszeichen.

11. 10. 36. 10 Uhr eine Prolaninjektion von 5000 RE.

19 Uhr eine Prolaninjektion von 5000 RE.



Der Harn wurde vom 11.—15. 10. 36 untersucht, größte Injektionsmenge war $6 \times 0,3$ ccm, 15fach konzentriert. Die Gesamthormonausscheidung: mehr als 572 ME A und mehr als 70 ME B. Größte Ausscheidung für B am zweiten Tag, für A am dritten Tag nach den Injektionen.

2c. Fr. A. T., 39 Jahre, 2 Partus, kein Abort.

Früher: Regel: alle 4 Wochen, 2 Tage, mittelfark.

Jetzt: Dauerblutung seit Juni 1936.

Klin. Diagnose vom 12. 11. 36: Glanduläre Hyperplasie.

Mikrosk. Diagn.: Glanduläre Hyperplasie, ganz beginnende Umwandlung in Sekretionsphase, Stroma stellenweise hypertrophisch.

7. 11. 36. 14 Uhr eine Prolaninjektion von 5000 RE.

20 Uhr eine Prolaninjektion von 5000 RE.

Der Harn wurde untersucht vom 6.—12. 11. 36, größte Injektionsmenge $6 \times 0,3$ ccm, 15fach konzentriert. Gesamthormonausscheidung: mehr als 893 ME A und mehr als 312 ME B. Größte Ausscheidung von A am dritten Tag nach den Injektionen. An der Ausscheidungskurve dieses Falles fällt folgendes auf: Schon vor der Injektion des Prolan ließ sich gonadotropes Hormon im Harn nachweisen, und zwar mehr als 25 ME B am Tag; dagegen entzog sich das A dem Nachweis dadurch, daß bei den Versuchstieren gleich eine Luteinisierung der Follikel auftrat. Selbstverständlich war es vorhanden; denn Follikel, die nicht unter dem Einfluß von A gestanden haben, können auch nicht luteinisiert werden. — Die Kurve ist sehr ungleichmäßig, was sowohl schon auf die Ungenauigkeit der Testierungsmethoden wie auch auf die ungleichmäßige Ausscheidung selbst zurückgeführt werden muß. An keinem Tag wurde die Höchstgrenze der Ausscheidung sicher erfaßt; weil die Testierung so lange Zeit (d. h. mehr als 5 Tage) erforderte, daß die Stammlösung verdarb und ihr Hormongehalt merklich abnahm. Aber noch aus einem weiteren Grunde ist die Angabe der tatsächlichen Ausscheidungswerte unmöglich; denn da schon vor der Prolaninjektion gonadotropes Vorderlappenhormon sich im Harn nachweisen ließ, so kann man annehmen, daß es auch während der oder eines der folgenden Tage im Urin vorhanden war, und dann hat es sich zu dem Prolan nicht nur addiert, sondern durch Potenzierung der gleichzeitigen Wirkung von Prolan und HVL kann es zu scheinbar sehr hohen Werten gekommen sein, die den tatsächlich ausgeschiedenen Prolanmengen gar nicht entsprechen.

ME

600

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

> 666

< 25
A

6. 11.

> 25
B

↑↑

> 131
A

7. 11.

> 131
B> 96
A

8. 11.

> 48
B> 133
A

9. 11.

< 26
B< 26
A

10. 11.

< 94
A

12. 11.

< 94
B


Frau A. T.
2c 39 Jahre
20

↑ = 5000 RE Prolan i. m.

3a. Fr. P. D., 44 Jahre, 2 Partus, 1 Abort.

Regel: alle 4 Wochen, 5 Tage, mittelftark.

Letzte Regel: 28. 12.—2. 1. 37.



Klin. Diagnose: Ca colli uteri Gr. II/III.

25. I. 37. 10 Uhr eine Prolaninjektion von 2000 RE.

20 Uhr eine Prolaninjektion von 2000 RE.

26. I. 37. 10 Uhr eine Prolaninjektion von 2000 RE.

20 Uhr, eine Prolaninjektion von 2000 RE.

27. I. 37. 10 Uhr eine Prolaninjektion von 2000 RE.

20 Uhr eine Prolaninjektion von 2000 RE.

Der Harn wurde untersucht vom 24.—30. I. 37, die größte injizierte Menge betrug 6\text{d}0,3 ccm, 15fach konzentriert. Gesamthormonausscheidung: mehr als 961 ME A und mehr als 93 ME B. Höchstausscheidung: dritter Tag nach dem Beginn der Injektionen.

3b. Fr. G. E., 54 Jahre, 1 Partus, kein Abort.

Früher: Regel: alle 4 Wochen, 8—10 Tage, sehr stark, letzte zwei Jahre: Blutung etwas zu früh.

Jetzt: seit Anfang November 36 Dauerblutung.

Klin. Diagnose: Glanduläre Hyperplasie und Corpuspolyp und Cervixpolyp.

Mikrosk. Diagn.: Corpuspolyp und Glanduläre Hyperplasie ohne Umwandlung in Sekretionsphase, keine wesentliche Entzündung.

27. II. 36. 10 Uhr eine Prolaninjektion von 2000 RE.

19 Uhr, eine Prolaninjektion von 2000 RE.

28. II. 36. 10 Uhr eine Prolaninjektion von 2000 RE.

19 Uhr eine Prolaninjektion von 2000 RE.


29. II. 36. 10 Uhr eine Prolaninjektion von 2000 RE.

19 Uhr: eine Prolaninjektion von 2000 RE.

Der Harn wurde untersucht vom 26. II.—3. III. 36.

Größte Injektionsmenge 6\text{d}0,3 ccm, 15fach konzentriert. Gesamthormonmenge: mehr als 1042 ME A und mehr als 297 ME B.

Größte Ausscheidung: am zweiten Tag nach Beginn der Injektionen. Auch für diesen Fall ist in gewissem Sinne eine Einschränkung zu machen, welche die für A angegebenen Werte betrifft: schon im Vorversuch ließ sich A feststellen, wenn auch nur in geringen Mengen.



Frau G. E.
 3b 54 Jahre ↑ = 2000 RE Prolan i. m.

Beipredung der Ergebnisse:

Vergleichen wir die ausgeschiedenen Gesamtmengen, so ist festzustellen, daß Fall 1a aus dem Rahmen herausfällt, was bei der Beschreibung der einzelnen Fälle bereits angedeutet wurde. Da die Ausscheidung hier die Einfuhr fast erreichte, so ist anzunehmen, daß irgend eine nicht entdeckte Quelle für Prolan A bzw. gonadotropes Hormon bestand. Dieser Fall muß also für die Beurteilung der Ergebnisse ausfallen. Einer ähnlichen Einschränkung bedarf es auch für Fall 1b, dessen Ausscheidungsmengen nicht lange genug verfolgt wurden.

Aus den übrigen Kurven lassen sich unter Berücksichtigung der geringen Zahl der Fälle und der Ungenauigkeit der Methode folgende Schlüsse ziehen:

Von den durch Injektion zugeführten Prolan-A-Mengen wurden innerhalb der Beobachtungszeit etwa 10—20% im Harn ausgeschieden. Die im Harn wiedergefundenen Prolan-B-Mengen schwanken sehr stark; es bestand kein einigermaßen gleichbleibendes Verhältnis zu den A-Werten. Die Gesamtausscheidung war bei Frauen mit erhaltenem Zyklus annähernd die gleiche wie bei Frauen mit Follikelperсистенz. Doch ist darauf hinzuweisen, daß die bei den letzteren gefundenen Ausscheidungswerte durch den schon vor der Prolaninjektion nachgewiesenen Hormongehalt des Harns beeinflusst worden sind. Deshalb stehen die vorliegenden Untersuchungen nicht ohne weiteres im Widerspruch zu oben erwähnten Ergebnissen von Erhardt und Winkler. — Die Ausscheidung des Prolans zog sich im allgemeinen über 4 Tage nach der Injektion hin.

Die höchste Ausscheidung fand sich meist am dritten Tag nach der Injektion.

Als Schlußfolgerung ergibt sich aus den mitgeteilten Ergebnissen:

1. Der weibliche Körper wird mit Prolanmengen, die im Vergleich zu den bisher üblichen therapeutischen Dosen als hoch bezeichnet werden müssen, ohne weiteres fertig; die injizierten Hormonmengen laufen nicht durch den Körper hindurch, um im Harn unverändert wieder zu erscheinen, sondern sie

verschwinden zum größten Teil — gleichgültig, ob der Körper sie „braucht“ (wie bei der Follikelpersistenz) oder nicht (wie beim normalen Zyklus). Die Befürchtung, daß bei Verwendung fog. hoher Dosen ein größerer Teil „ungenützt“ den Kreislauf verläßt, ist also nicht gerechtfertigt.

2. Die Resorption des Prolan aus wässriger Flüssigkeit erfolgt auffallend spät; sie erreicht ihren Höhepunkt etwa am dritten Tag. Das muß bei der Behandlung in Rechnung gestellt werden. Wenn es erlaubt ist, aus den Hormonwerten im Harn auf diejenigen im Blut zu schließen, so geht aus den vorliegenden Untersuchungen z. B. hervor, wie sehr die intravenöse Verabreichung von Hormonen, etwa in Form der Schwangerenblutübertragung, der intramuskulären dann überlegen sein muß, sobald es darauf ankommt, einen „Hormonstoß“, d. h. eine plötzliche, wenn auch kurz dauernde Erhöhung des B-Hormonspiegels im Blut zu erzielen, wie etwa bei der Behandlung der Follikelpersistenz.

Z u s a m m e n f a s s u n g :

1. In 8 Fällen wurde die Ausscheidung von gonadotropem Hormon im Harn nach peroraler Zufuhr hoher Dosen von Prolan in Form besonders dragierter Tabletten untersucht. Es ließ sich mit den üblichen Methoden kein Hormon nachweisen. Allerdings fehlt der Nachweis, daß das Hormon aus den Dragées tatsächlich resorbiert wurde.
2. In weiteren 7 Fällen wurde die Ausscheidung von gonadotropem Hormon im Harn nach parenteraler Zufuhr von 5000—12 000 RE Prolan untersucht. Die Ergebnisse von 5 Fällen sind verwertbar.
3. Es ergab sich, daß etwa 10—20% der (in ein oder mehrmaliger Injektion) verabreichten Prolan-A-Mengen im Harn wieder erschienen. Die ausgeschiedenen Prolan-B-Mengen waren ungleich groß, hielten sich aber immer stark unterhalb des Prolan-A-Spiegels.
4. Die Prolanausscheidung war in etwa 4 Tagen beendet; die größte Tagesausscheidung ließ sich meist am dritten Tag nach der Injektion feststellen.

5. Die bei den Untersuchungen verwendeten Prolandofen, die über das übliche Maß der bisher verabreichten weit hinausgehen, werden vom Körper ebenso gut „verarbeitet“ wie die kleinen Mengen; die Befürchtung, daß hohe Dosen den Körper unverändert und deshalb ungenützt durchlaufen, ist also nicht gerechtfertigt. Die Verabreichung großer Dosen kann demnach dort, wo sie notwendig ist, nicht als unwirtschaftlich abgelehnt werden.
-

Es ist mir eine angenehme Pflicht, Herrn Prof. Dr. Siebke für die Überlassung des Themas zu danken. Ebenso danke ich Herrn Dr. med. habil. W. Büttner für seine unermüdliche und freundliche Hilfe bei der Anfertigung dieser Arbeit.

Literaturverzeichnis.

- Büttner, W.: Die Wirkung des Follikelhormons und der gonadotropen Hormone bei der Frau in anatomischer und funktioneller Betrachtung. Arch. Gyn. 163, 1937.
- Damm, P. N.: Menstruationsstörungen hormonalen Ursprungs. J. A. Barth, Leipzig 1936.
- Davy u. Sevringhans: Völlige Erfassung der gonadotropen Substanz des Urins von Frauen. Proc. soc. exp. biol. a. medicine Bd. 30, S. 1422.
- Erhardt: Deutsche Med. Wochenschr. 1930 Nr. 11 u. 37. Arch. Gyn. 154. 293 (1933).
- Fluhmann: Hyperplasie des Endometriums und ihre Beziehungen zum Hypophysenvorderlappen und zu den Ovarien. Ber. 20, 727.
- Frank u. Salomon: Zyklen des gonadotropen Faktors in Blut und Harn bei der normal menstruierenden Frau, Ber. 30, 321.
- Hamburger, Chr.: Studien über gonadotrope Hormone aus der Hypophyse und dem chorialen Gewebe. Acta path. et microbiol. scandinav., Suppl. 17, 1933.
- Hamblen u. Roß: Amer. J. Obstr. 31, 14 1936.
- Katzmann u. Doisy: Quantitative Methode zur Bestimmung von Prolan. Proc. soc. of exper. biol. a. medecin 30, 1188.
- Darstellung des Prolans, Ber. 25, 648.
- Lipfchütz: Das Los der gonadotropen Hormone im Blut, Ber. 32, 472.
- Marshall: Die gonadotropen Hormone. Ber. 26, 318.
- Massao Ito: Über das gonadotrope Hormon aus Schwangerenharn. Zbl. Gyn. 375, 1936.
- Parkes u. White: J. of Physiol. 79, 226 (1933).
- Trettenero: Riv. ital. ginec. 19, 380, 1936.
- Zondek, B.: Ausscheidung des Hypophysenvorderlappenhormons A im Zyklus. Ber. 21. 764.
- Weitere Untersuchungen zur Darstellung, Biologie u. Klinik des Hypophysenvorderlappenhormons. Zbl. Gyn. 834, 1929.
- Hormone des Ovariums und des Hypophysenvorderlappens. 2. Aufl. Springer, Wien 1935.
-

Lebenslauf.

Am 21. 6. 1912 wurde ich in Köln als Tochter der Eheleute Joseph Millard und Maria, geb. Kröll, geboren. Ich besuchte die realgymnasiale Studienanstalt in Neuß, wo ich Ostern 1932 die Reifeprüfung bestand. Meine vorklinischen Studien machte ich in Köln und Bonn. Die ärztliche Vorprüfung bestand ich 1934 in Bonn. Nachdem ich meine klinischen Studien in Würzburg und Bonn machte, bestand ich Dezember 1937 das ärztliche Staatsexamen in Bonn mit gut.
